




مرکز آموزشی و درمانی
تخصصی و فوق تخصصی کودکان بو علی اردبیل

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی کودکان بوعلی اردبیل

آزمایش مایع مغزی نخاعی

LP



تهیه شده:

واحد آموزش سلامت به بیمار و خانواده

1404

در صورت دیدن علائم زیر به پزشک یا پرستار اطلاع دهید!

- ❖ خیس شدن پانسمان محل آزمایش
- ❖ تب یا افزایش درجه حرارت بدن بیشتر از ۳۷/۸
- ❖ قرمزی و وجود ترشح چرکی یا کم رنگ از اطراف محل خروج سوزن

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد بیماری کودکان در روزهای غیر تعطیل ساعت ۸-۱۴ ، با شماره ۳۳۲۵۲۲۵۲ داخلی ۳۲۱ واحد پیگیری بیمار تماس بگیرید.



منابع:

کتاب مراقبت های پرستاری کودکان

www.medlineplus.com

مراقبت های بعد از گرفتن مایع نخاعی (LP):

- قرار دادن بیمار در وضعیت خوابیده و صاف برای مدت ۶ الی ۲۴ ساعت
- کنترل علائم حیاتی و سطح هوشیاری
- کنترل تورم یا خونریزی محل نمونه گیری
- کنترل ضعف حرکات اندام های تحتانی
- کنترل تغییرات در سطح هوشیاری بیمار
- مصرف شیرمادر یا مایعات خوراکی
- درد و ناراحتی کودک در محل گرفتن مایع نخاعی شایع می باشد که با استراحت برطرف می شود
- سردرد ممکن است مربوط به نشت مایع مغزی نخاعی در محل نمونه گیری باشد که نیاز به بکار بردن پانسمان در محل نمونه گیری و استفاده از مسکن دارد
- پانسمان محل LP را می توان پس از ۲۴ ساعت برداشت و در صورتی که از سایر جهات ممنوعیتی وجود نداشته باشد می توان پس از ۲ تا ۳ روز حمام نمود