


پورت چیست؟

پورت یک لوله پلاستیکی نرم و نازک می باشد که به داخل ورید می رود و معمولا روی قفسه سینه تعبیه می شود و بخشی از آن خارج از بدن باقی می ماند تا به راحتی دارو از طریق آن به بدن کودک وارد شود و نیاز به رگ گیری متعدد نباشد.

مراقبت ها بعد از پورت گذاری:

- ممکن است محل تا چند روز درد و کبودی داشته باشد که با داروی مسکن درد برطرف می شود.
- به مدت 5 روز بعد از عمل آنتی بیوتیک خوراکی برای پیشگیری از عفونت مصرف شود .
- 10 روز بعد از پورت گذاری بخیه ها باید کشیده شود.



مزایای استفاده پورت :


- ریسک کم عفونت و آلودگی
- ادامه زندگی روزمره با داشتن پورت
- عدم محدودیت برای شستشوی بدن
- عدم رگ گیری های متعدد و ایجاد آسیب کمتر
- به عروق و در کاهش استرس های کودکان بسیار موثر می باشند.

- تزریق کلیه داروها از طریق پورت

- از سفت و طنابی شدن رگ ها پیشگیری می شود

موارد ممنوعیت پورت گذاری :

- مشکلات انعقادی
- در دسترس نبودن محل مناسب
- عفونت پوست



عوارض پورت گذاری :

- ❖ عفونت در برخی موارد
- ❖ ایجاد لخته در برخی مواقع
- ❖ جدا شدن مخزن و جا به جایی در صورت عدم رعایت نکات ایمنی

توجهات مهم :

- ✓ پس از هر بار تزریق شیمی درمانی ، دارو ، خون ، مخزن پورت، باید با سرم فیزیولوژی ، همراه با هپارین شستشو شود.
- ✓ اگر از پورت استفاده نمی شود لازم است هر ماه با سرم همراه با 1000 واحد هپارین شستشو انجام شود.
- ✓ به طور معمول تا حدود 1000 مرتبه تزریق در مخزن قابل استفاده است .
- ✓ بلافاصله بعد از جای گذاری و پس از اینکه گرافی کنترل انجام شد و توسط پزشک رویت شد می توان تزریق را شروع کرد اما بهتر است 3 تا 5 روز از زمان پورت گذاری بگذرد تا التهاب کاهش یابد.