



درمان:

1. وجود عفونت خونی و یا حتی شک به آن در نوزادان مستلزم مراقبت های ویژه و اقدام درمانی بیمارستانی می باشد.
2. وقتی کشت های مناسب انجام گردید، درمان آنتی بیوتیک داخل وریدی باید فوراً آغاز شود.
3. نوع آنتی بیوتیک و طول مدت درمان با نظر پزشک معالج می باشد.

شایع ترین علامت در نوزادان شامل عدم توانایی یا اشکال در شیرخوردن می باشد.

تشخیص:

1. شرح حال مادر اطلاعات مفیدی در تشخیص بیمار می دهد
2. معاینه پزشکی
3. تست های آزمایشگاهی که شامل کشیدن مایع از نخاع، آزمایش خون، کشت خون، کشت ادرار، در صورت نیاز رادیوگرافی قفسه سینه می باشد.

مهمترین معیار تشخیص برای اثبات عفونت، وجود کشت خون مثبت است



سپتی سمی نوزادی

وجود علائم تب، عدم توانایی در شیرخوردن، وقفه تنفسی، تحریک پذیری در نوزادی که سن کمتر از 28 روز دارد، همراه با کشت مثبت را عفونت خونی می گویند که یک حالت اورژانسی است و باید درمان شروع شود.

روش های انتقال عفونت به نوزادی

1. عفونت های داخل رحمی
2. عامل دیگر عفونت عبور از کانال زایمانی است (در کانال زایمانی انسان میکروب های وجود دارند، که منجر به عفونت در هنگام تولد می شود)
3. خوردن مایع آلوده کیسه آب به داخل ریه ها
4. در معرض عفونت قرار گرفتن نوزاد در بیمارستان

علائم بیماری:

تب، شیر نخوردن، تنفس سریع، کیودی، وقفه تنفسی، عدم دفع ادرار، خونریزی، اتساع شکم، زردی، تحریک پذیری، تشنج