




مرکز آموزشی و درمانی
تخصصی و فوق تخصصی کودکان بو علی اردبیل

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی کودکان بوعلی اردبیل

سپسیس نوزادی




تهیه شده:

واحد آموزش سلامت به بیمار و خانواده

1404

اگر درجه حرارت مقعدی شیرخوار 38 درجه سانتی
گراد باشد و علائمی شبیه خواب آلودگی ، کم اشتها
و مشکل تنفسی داشته باشد، بهتر است به پزشک
مراجعه کنید.



در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد بیماری
کودکان از ساعت 8:00 الی 14:00، با شماره
33252252 داخلی 321 واحد پیگیری بیمار
تماس بگیرید.



منبع:

www.parastari-mehr.blogfa.com
www.pezashk.us

درمان

نوزاد مبتلا به سپسیس یا حتی موارد مشکوک به
آن، در بیمارستان جهت درمان بستری می شوند و
با دیدن علائم عفونت نهفته، پزشکان آنتی بیوتیک
های لازم تزریقی را برای مقابله با عفونت در
نوزاد شروع می کنند. قطعا پزشکان برای
عفونت نوزادان، آنتی بیوتیک تراپی را حتی قبل
از تشخیص قطعی، شروع می کنند.

هشدار

وجود هرگونه عفونت در نوزادان یا شیرخواران
در مقایسه با اطفال و بالغین بسیار خطرناک تر
است. در این گروه ها سیستم ایمنی به خوبی شکل
نگرفته است و هنوز توان مقابله با انواع عفونت
ها را پیدا نکرده، همین علت است که گفته می
شود باید درمان عفونت نوزادان در بیمارستان
صورت گیرد.

شیرخواران زیر 2 ماه، بیشتر مستعد عفونت
خون (سپسیس) هستند زیرا سیستم ایمنی آنها
هنوز بقدر کافی جهت دفع برخی از منابع عفونی
، رشد نکرده است.