



مرکز آموزشی و درمانی
تخصصی و فوق تخصصی کودکان بو علی اردبیل

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی کودکان بوعلی اردبیل

فتق کشاله ران در نوزادان



تهیه شده:

واحد آموزش سلامت به بیمار و خانواده

1404

– در صورت تجویز داروی آنتی بیوتیک آن را در زمان مشخص و به طور کامل مصرف کنید.

– آغوش گرفتن کودک پس از جراحی طوری که ناحیه عمل تحت فشار نباشد مانعی ندارد.

– در بیماران پسر بعد از عمل ناحیه بیضه ها کمی متورم میشود که طبیعی است.

– از انجام بازیهای سنگین مانند پریدن و دویدن و شناکردن توسط کودک اجتناب شود

با آرزوی سلامتی برای شما و فرزند دلبندتان برای کسب اطلاعات و پیگیری بیشتر، با درمانگاه سلامت تماس بگیرید.

آدرس:

اردبیل، میدان ورزش، روبروی پارک معلم، کلینیک

کوثر، طبقه ی همکف ، درمانگاه سلامت

شماره تماس:

04533252252

داخلی 321

ساعت حضور کارشناس پرستاری : 8-14

مراقبت های بعد از عمل
2-3 روز بعد از عمل محل جراحی با پانسمان پوشیده باشد. مراقب باشد که پوشک کودک با ناحیه عمل تماس نداشته باشد.

– در صورتی که کودک درد داشته باشد می تواند داروهای تجویز شده (شیاف استامینوفن) استفاده نمود و یا از کمپرسرد (پیچیده شده در داخل پارچه) به مدت 20 دقیقه استفاده کرد.

– تا زمان کشیدن یا جذب شدن بخیه ها خروج مقداری خون یا ترشح از محل بخیه ها طبیعی می باشد 7-10 روز بعد از عمل لازم است برای کشیدن بخیه ها به درمانگاه

مراجعه کنید.

– بعد از کشیدن بخیه هت میتوانید محل با آب و صابون ملایم شستشو دهید و به آرامی خشک کنید.