



مرکز آموزشی و درمانی
تخصصی و فوق تخصصی کودکان بو علی اردبیل

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی کودکان بوعلی اردبیل

دیابت در کودکان



تهیه شده:

واحد آموزش سلامت به بیمار و خانواده
با نظارت دکتر کاتبی فوق تخصص غدد کودکان

1404

اقدامی که باید در کمای دیابتی تا رسیدن به اولین مرکز درمانی انجام دهید شامل: اگر کودک هوشیار باشد مایعات بدون قند مانند آب و چای به کودک بدهید در غیر این صورت نباید به کودک از راه خوراکی چیزی داده شود.



در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد بیماری کودکان، با شماره ی 33252252 - 045 داخلی 321 واحد پیگیری بیمار از ساعت 8 الی 14 روزهای غیر تعطیل تماس بگیرید.

منبع: مراقبت های پرستاری کودکان

کتواسیدوز دیابتی

وقتی بدن نتواند از قند خون به طور کافی استفاده کند شروع به سوزاندن چربی می کند و مواد زائدی تولید می کند به نام کتون که در خون انباشه شده و ایجاد کمای دیابتی می کند که در تزریق کم و نامناسب انسولین رخ می دهد.

کتواسیدوز دیابتی یک وضعیت بسیار اورژانسی می باشد و کودک باید به اولین مرکز درمانی برده شده و به سرعت درمان شود

علائم کتواسیدوز دیابتی :

اگر فرزند شما دارای هر کدام از علائم زیر باشد با پزشک تماس بگیرید.

- کاهش آب بدن
- چشمان گود رفته
- لب های خشک و پوسته پوسته شده
- خواب آلودگی و تنفس دشوار
- استفراغ و درد شکم
- تنفس با بوی میوه گندیده