




مرکز آموزشی و درمانی
تخصصی و فوق تخصصی کودکان بو علی اردبیل

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی کودکان بوعلی اردبیل

مننژیت در کودکان



بیماری مننژیت

تهیه شده:

واحد آموزش سلامت به بیمار و خانواده

1404

توجه

با دیدن علائم زیر کودک را سریعتر به نزدیکترین مرکز درمانی ببرید؟

- تب بالا
- تشنج
- داشتن گردن سفت
- گیجی و خواب
- آلودگی
- تهوع و استفراغ
- سردرد شدید
- تنفس مشکل
- بی قراری
- اگر کودک شما کمتر از 3 ماه دارد و تب 38 درجه و بالاتر دارد.

پیگیری

برای تعیین اینکه آیا شنوایی کودک تحت تاثیر قرار گرفته پزشک در زمان ترخیص درخواست آزمایش شنوایی می کند و همچنین کودک از نظر علایم تاخیر در رشد (به عنوان مثال عدم راه رفتن، صحبت کردن و غیره در زمان مورد انتظار) تحت نظر قرار می گیرد.

در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد بیماری کودکان، با شماره 33252252 داخلی 321 واحد پیگیری بیمارارز ساعت 8 الی 14 روزهای غیر تعطیل تماس بگیرید.

منابع:

Clinicalkey. Patient Education :Bacterial Meningitis&Viral meningitis
Pediatric.Elsevier Interactive Patient Education © 2019 Elsevier Inc.

چگونه میتوانم به پیشگیری از مننژیت در فرزندم کمک

کنم؟

- واکسیناسیون کودک را از بدو تولد کامل انجام دهید.
- هر سال واکسن آنفلوآنزا تزریق کنید.
- از تماس نزدیک با افراد بیمار خوداری کنید.
- دست ها را مرتب بشوید.
- در هنگام سرفه و عطسه دهان خود را با دستمال بپوشانید.
- از لوازم شخصی کودک استفاده کنید.

چگونه از فرزند بیمارم در منزل مراقبت کنم؟

- مصرف مرتب داروها را طبق دستور پزشک حتی با وجود علائم بهبودی تا اتمام داروها ادامه دهید.
- از مصرف داروهای بدون نسخه خودداری کنید.
- کودک را به مصرف مایعات و استراحت تشویق کنید.
- دست ها را بخصوص بعد از عطسه و سرفه با آب و صابون به مدت 30 ثانیه بشوید.
- از تماس نزدیک کودک با دیگران خودداری کنید.

