



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

ایمنی بیمار در دارو دهی



WORK TOGETHER FOR
PATIENT SAFETY

داروهای پرخطر (با هشدار بالا) با برچسب قرمز علامت گذاری نموده و در زمان مصرف توجه ویژه داشته باشید. در زمان استفاده از داروهای پرخطر (هشدار بالا) شناسایی بیمار باید توسط دو پرستار انجام شود دستورات مشاوره را پس از Re order دستورات اجرا نمایید. دارو دهی حتماً با تالی دارای وسایل و سفتی باکس انجام شود. کشیدن دارو بر بالین بیمار انجام شود.



تهیه و تنظیم: ناطق

واحد آموزش سلامت بیمار و خانواده ۱۴۰۱

جهت پیشگیری از خطاهای دارویی موارد ذیل رعایت شود

اقدامات پرستاری را فقط با روش کیس متد (پرستار مشخص برای هر بیمار) انجام دهید.

رعایت دستورالعمل دارو دهی صحیح ۷ گام

- داروی صحیح - راه 7 دستورالعمل دارو دهی صحیح
- مصرف صحیح - زمان صحیح - دوز مصرف صحیح - ثبت صحیح - تجویز - بیمار صحیح

در صورت شک به دارو، دوز، روش تزریق و حتماً صحت دستور را مجدداً با پزشک مربوطه کنترل نمایید. از اجرای دستور مخدوش و غیر قابل خواندن تا زمان استعلا و تأیید خوداری نمایید.

اجرای صحیح فرایند چک مجدد داروهای پرخطر توسط پرستار دوم را رعایت نمایید.

لیست داروهای مشابه (از نظر شکل، تلفظ و نوشتار) در هر بخش با برچسب زرد موجود باشد و به آن توجه نمایید.

فاصله گذاری محل نگهداری داروهای مشابه و با هشدار بالا در انبار دارویی، داروخانه، یخچال و استوک دارویی موجود در بخش‌ها در پیشگیری از بروز اشتباهات دارو لازم می باشد.