



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

فودمراقبتی

بیماری فاویسم



تهیه کننده:

واحد آموزش سلامت به بیمار و خانواده

1402

لیست عواملی که در مبتلایان به فاویسم باعث
تخریب گلوبول قرمز می شود:

● مشتقات ویتامین کا

داروهای ضد مالاریا : کلروکین / پریماکین / پاماکین /

کیناکرین / کینین سولفونامیدها

کوآتریموکسازول (تری متو پریم - سولفومتوکسازول) /

نالیدیکسیک اسید (/ سولفاستامید / سولفاپریدین /

سولفانیلامید / سولفادیازین / سولفی سوکسازول

ترکیبات نیترو فوران : فوروکسون / فورودانتین / فورابن /

نیتروفوراتوئین / فورازولیدون / نیتروفورازون (فوراسین)

/ سپتاپرین /

داروهای متفرقه : آسپرین / استامینوفن / سیپروفلوکساسین /

نفتالین / متیلن بلو / پروبنسید / استیل سالیسیلیک اسید /

فنازوپریدین / فنیل هیدرازین /

بنزن / ایزونیاژید / بلودومتیلین

منبع: ونگ-برونر

آیا بیماران مبتلا به فاویسم می توانند از ویتامینها
و مواد معدنی استفاده کنند؟

مصرف مکملها در بیماران مبتلا به فاویسم، باید با اطلاع

پزشک معالج باشد. مصرف ویتامینها و مواد معدنی در

صورتی که زیر نظر پزشک معالج باشد، هیچ خطری را

برای این بیماران ایجاد نخواهد کرد .

آیا فاویسم قابل درمان است؟

این بیماری درمان قطعی ندارد و تنها اقدام موثر،

پیشگیری از بروز حمله همولیز با پرهیز از مواجهه با مواد

اکسیدان و در صورت بروز حمله مراجعه سریع به پزشک

جهت اقدامات نگهدارنده و حمایتی جهت پیشگیری از

عوارض همولیز است. درمان فاویسم شامل حذف عوامل

محرک این بیماری است. به عبارت دیگر شما باید

بیماری یا عفونت کودکان را مداوا کرده و مصرف

برخی داروها را متوقف کنید. برخی از کودکان که عالیم

شدید کم خونی را نشان می دهند باید در بیمارستان تحت

درمان قرار گیرند. در بیمارستان به این افراد، اکسیژن،

مایعات و در صورت نیاز خون سالم، تزریق می شود. در

برخی موارد بسیار نادر، این بیماری ممکن است به

مشکالت جدی جسمی منجر شود.

: