

## متادون چیست؟

داروی متادون به دو شکل شربت و قرص در مراکز ترک اعتیاد جهت درمان وابستگی به مواد افیونی استفاده می شود . متادون دارویی است که با تجویز پزشک در درمان اعتیاد مورد استفاده قرار می گیرد و با وجود موفقیت اثبات شده این شیوه درمانی در بسیاری از کشورهای جهان ، در صورت مصرف سهل انگارانه و غیر مسئولانه ممکن است خطراتی جدی ایجاد کند.

**بسیاری از بیماران علی رغم تحویل داروی متادون در ظرف خودش ، به دلیل ترس از آگاهی خانواده از اعتیاد ایشان ، متادون را در ظروف غیر دارویی نگهداری می کنند .**

این مسئله باعث بالا رفتن آمار مسمومیت های اتفاقی در کودکان شده است . توجه کنید که مقدار بسیار اندک از متادون می تواند باعث مسمومیت های شدید و حتی مرگ در کودکان شود .

۱۰ درصد از مرگ کودکان ۲-۷ ساله در اثر مصرف اتفاقی متادون گزارش شده است که به دلیل بی احتیاطی فرد مصرف کننده متادون ، والدین و یا سرپرست خانواده دچار گشته اند .

## علائم مسمومیت:

۱. کاهش سطح هوشیاری
۲. کاهش تعداد تنفس
۳. نبض ضعیف
۴. افت فشارخون
۵. تنگی مردمک چشم
۶. سفتی عضلات
۷. کاهش حرکات روده ای
۸. تهوع استفراغ



**در صورتیکه کودک شما شربت یا دارو را خورده باشد ، با مرکز اورژانس شماره تلفن ۱۱۵ و یا مرکز کنترل مسمومیتها با شماره تلفن ۱۹۰ تماس بگیرید**

## درمان :

۱. دراولین فرصت کودک را به بیمارستان بیاورید
۲. دریافت اکسیژن
۳. مطمئن شدن از باز بودن راه هوایی
۴. تزریق داروی نالوکسان
۵. شستشوی معده
۶. اخذ نوار قلب
۷. تزریق سرم
۸. ناشتا نگذاشته شدن کودک به مدت چند ساعت تا بر طرف شدن تهوع استفراغ
۹. مونیتورینگ قلبی تنفسی
۱۰. ارسال نمونه خون و ادرار از کودک به آزمایشگاه
۱۱. بستری شدن کودک به مدت ۴۸ ساعت در بیمارستان